


ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများတွင် အဖြစ်နည်းသော်လည်း  
ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဦးနှောက်နှင့်  
အာရုံကြောဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ



စိတ်တုခြင်း




စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း



သတိလစ်ခြင်း၊  
တခါတရံတက်ခြင်း



စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း



အိပ်မပျော်ခြင်း

စိတ်သောကများခြင်း  
လေဖြစ်ခြင်း ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သော  
ရှားပါး၍ ပိုမိုပြင်းထန်သော အာရုံကြောဆိုင်ရာ  
နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်  
တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေများ

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေးနှစ်မျိုးလုံးတွင်  
မတူညီသော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဆင့်များ  
ရှိနိုင်သည်။


အချို့သောသူများတွင် ရောဂါလက္ခဏာမရှိပဲ၊  
အချို့မှာ အပျော့စား  
လက္ခဏာများ

(သို့မဟုတ်)

ပြင်းထန်သော  
ရောဂါလက္ခဏာများ  
ခံစားရနိုင်သည်။



ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေး ရောဂါနှစ်မျိုးစလုံးသည်  
အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။



World Health  
Organization  
Myanmar



ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်  
တုပ်ကွေးရောဂါ  
လက္ခဏာများ



ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေး မိုင်းရပ်စ်နှစ်မျိုးလုံးတွင်  
တွေ့လေ့ရှိသော တူညီသည့်လက္ခဏာများ



ဖျားခြင်း

ချောင်းဆိုးခြင်း



ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း

နှာရည်ယိုခြင်း



လည်ချောင်းနာခြင်း

ခေါင်းကိုက်ခြင်း



အရိုးဆစ်နှင့်  
ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း

အဖြစ်နည်းသော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ လူနာအချို့တွင်  
တွေ့လေ့ရှိသော အခြားရောဂါလက္ခဏာများ



ရုတ်တရက်  
အနံ့ပျောက်ခြင်း၊  
အရသာပျောက်ခြင်း။

နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း။



မျက်သားအဖြူမှာ  
နီလာခြင်း။




အရေပြားနီမြန်းခြင်း။



အော့အန်ခြင်း။



ဝမ်းပျက်ခြင်း။




ချမ်းတုန်ခြင်း (သို့မဟုတ်)  
မူးဝေခြင်း။



ပြင်းထန်သော  
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလက္ခဏာများ

အသက်ရှူရ  
ခက်ခဲခြင်း။



စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ  
ပြောင်းလဲမှု  
ဖြစ်ခြင်း၊  
စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း။



အဆက်မပြတ်  
ရင်ဘတ်  
အောင့်ခြင်း။



အဖျား  
အလွန်ကြီးခြင်း  
(၃၈ ဒီဂရီ  
စင်တီဂရိတ်နှင့်  
အထက်ရှိခြင်း)

